

อันตราย ที่เกิดจาก การใช้ยาในทางที่ผิด



ยาแก้ปวด



ยาแก้แพ้/ยานอนหลับ



ยาแก้ไอ

ยารักษาโรค ที่มักใช้ในทางที่ผิด

“

การใช้ยาในทางที่ผิด
อันตราย นำไปสู่
การใช้สารเสพติดที่รุนแรง
หรือยาเสพติดในที่สุด ”

”



อันตรายจากยาไม่ว่าจะใช้เดี่ยว
ผสม หรือสลับ



- การใช้ยาเกินขนาด
- ผลข้างเคียงของยา
- การแพ้ยา



อาการ

เป็นพิษ ต่อตับ ไต

มึนงง ง่วงซึม หมดสติ ชัก
หยุดหายใจ และเสียชีวิต
เฉียบพลัน

ผลกระทบ

ตนเอง สุขภาพเสื่อมโทรม
ครอบครัว เสี่ยงทรัพย์สิน เสียชื่อเสียง
สังคมและ ความไม่ปลอดภัยในชุมชน

พบการลักลอบจำหน่ายยาเพื่อใช้ในทางที่ผิดแจ้ง สายด่วน อย. 1556

ร่วมแก้ไขปัญหา

พ่อแม่/ครู

ให้ความรู้ถึงโทษ ให้ความเอาใจใส่
พูดคุย ด้วยความเข้าใจ สังเกตพฤติกรรม
และให้คำปรึกษาที่เหมาะสม

เพื่อน

สังเกตพฤติกรรม หากสงสัย
ว่าเพื่อนอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา
ให้แจ้งครูเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด

ธุรกิจร้านขายยา/เภสัช

เฝ้าระวังและไม่จำหน่ายให้กับผู้ที่สงสัย
ว่าจะนำไปใช้ในทางที่ผิด

การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น

ก่อนรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

- กรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น** ให้ทำการปั๊มหัวใจ
- กรณีผู้ป่วยหยุดหายใจ** ให้พายปอด
- กรณีผู้ป่วยหมดสติ** จัดท่านอนตะแคงซ้าย เพื่อลดอาการสำลัก
(ห้าม กระตุกให้อาเจียน ล้วงคอ หรือให้กินสารใดๆ)
- กรณีผู้ป่วยชัก** ป้องกันการการล้ม หรือบาดเจ็บจากการกระแทก
(ห้าม ใช้ไม้ ช้อน ของแข็ง หรือมือจัดปากผู้ป่วย
เพราะอาจทำให้สำลัก หรืออุดกั้นทางเดินหายใจ
เมื่อหยุดชัก จัดผู้ป่วยในท่าตะแคงซ้าย)

"ดูแล ใส่ใจเยาวชน
ไม่ตกเป็นทาส...ยาเสพติด"



“ ผู้เสพ — คือ — ผู้ป่วย ”



สมัคร ♥ เข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด

นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ของรัฐบาล “ ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ”

4 ขั้นตอน การรักษา

ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด



1 เตรียมตัว เข้ารับ



2 ก่อน พินยา



4 ติดตาม ดูแล



3 ฟันฟู สมรรถภาพ



ติดตามเสพติด “ เลิกได้ ”
ด้วยความตั้งใจจริง และการเอาใจใส่ของคนใกล้ชิด

ติดตาม รักษาได้

ใช้ชีวิตอย่างปกติสุข



ต้องได้รับการรักษา
จากแพทย์



บำบัดได้ที่
โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง



ไม่มีค่าใช้จ่าย



ไม่เสียประวัติ
ไม่ลงบันทึกอาชญากรรม



ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ

5 เทคนิค เปลี่ยนคนติดยาเสพติด เป็นคนใหม่



ให้กำลังใจ
และเชื่อมั่นในตัวเขา



เปิดใจคุย
ไม่ควรตำหนิ



พูดคุย
ให้บ่อยขึ้น



พาไปพบแพทย์
เพื่อรักษาให้ถูกวิธี



อ้อมกอด
สัมผัสทางกาย



อันตราย ที่เกิดจาก การใช้ยาในทางที่ผิด



ยาแก้ปวด



ยาแก้แพ้/ยานอนหลับ



ยาแก้ไอ

ยารักษาโรค ที่มักใช้ในทางที่ผิด

“

การใช้ยาในทางที่ผิด
อันตราย นำไปสู่
การใช้สารเสพติดที่รุนแรง
หรือยาเสพติดในที่สุด ”

”



อันตรายจากยาไม่ว่าจะใช้เดี่ยว
ผสม หรือสลับ



- การใช้ยาเกินขนาด
- ผลข้างเคียงของยา
- การแพ้ยา



อาการ เป็นพิษ ต่อตับ ไต

มึนงง ง่วงซึม หมดสติ ชัก
หยุดหายใจ และเสียชีวิต
เฉียบพลัน

ผลกระทบ

ตนเอง สุขภาพเสื่อมโทรม
ครอบครัว เสี่ยงทรัพย์สิน เสียชื่อเสียง
สังคมและ ความไม่ปลอดภัยในชุมชน

พบการลักลอบจำหน่ายยาเพื่อใช้ในทางที่ผิดแจ้ง สายด่วน อย. 1556

ร่วมแก้ไขปัญหา

พ่อแม่/ครู

ให้ความรู้ถึงโทษ ให้ความเอาใจใส่
พูดคุย ด้วยความเข้าใจ สังเกตพฤติกรรม
และให้คำปรึกษาที่เหมาะสม

เพื่อน

สังเกตพฤติกรรม หากสงสัย
ว่าเพื่อนอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยา
ให้แจ้งครูเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด

ธุรกิจร้านขายยา/เภสัช

เฝ้าระวังและไม่จำหน่ายให้กับผู้ที่สงสัย
ว่าจะนำไปใช้ในทางที่ผิด

การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น

ก่อนรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

- กรณีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น** ให้ทำการปั๊มหัวใจ
- กรณีผู้ป่วยหยุดหายใจ** ให้พายปอด
- กรณีผู้ป่วยหมดสติ** จัดท่านอนตะแคงซ้าย เพื่อลดอาการสำลัก
(ห้าม กระตุกให้อาเจียน ล้วงคอ หรือให้กินสารใดๆ)
- กรณีผู้ป่วยชัก** ป้องกันการการล้ม หรือบาดเจ็บจากการกระแทก
(ห้าม ใช้ไม้ ช้อน ของแข็ง หรือมือจัดปากผู้ป่วย
เพราะอาจทำให้สำลัก หรืออุดกั้นทางเดินหายใจ
เมื่อหยุดชัก จัดผู้ป่วยในท่าตะแคงซ้าย)

"ดูแล ใส่ใจเยาวชน
ไม่ตกเป็นทาส...ยาเสพติด"



W.S.U. ยานาพลัดใหม่

1

การฝึกปฏิบัติจริง
ในสถานการณ์จริง



การฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง
เช่น การฝึกซ้อม
การฝึกปฏิบัติจริง

2

การฝึกปฏิบัติจริง
ในสถานการณ์จริง



การฝึกปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง

การฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกปฏิบัติจริง



การฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกปฏิบัติจริง

การฝึกปฏิบัติจริง

1

การฝึกปฏิบัติจริง

2

การฝึกปฏิบัติจริง

